



© THERMOS

Apresenta uma ampla distribuição no norte e centro da Europa, algo mais descontínua no sul. Ave de rapina florestal que se encontra presente em toda a Península Ibérica, ligada a todos os tipos de bosques. O intervalo de temperatura da sua distribuição na Península varia entre os -10.3°C e os 36.3°C, e o da precipitação entre os 214 mm e os 1944 mm anuais.

Distribución amplia en el norte y centro de Europa, algo más discontinua en el sur del continente. Rapaz eminentemente forestal que ocupa la totalidad de la Península Ibérica, vinculada a todo tipo de bosques. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -10.3°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1944 mm al año.

PRESENTE



TSS: 0,4034

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050



2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	-25	-23	-56	54	53	59
2051-2080	-44	-52	-65	58	57	61

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

- Protecção jurídica.
- Medidas para conservação in situ.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.