




© JAVIER MILLA

Apresenta ampla distribuição na Europa, desde o Mediterrâneo até às zonas temperadas dos países nórdicos. Está presente em toda a Península Ibérica, com exceção da faixa costeira do Mediterrâneo. É muito mais comum na metade ocidental e a norte, onde está presente em montado, prados e espaços abertos, frequentando propriedades agrícolas, povoações e aterros. O intervalo de temperatura da sua distribuição na Península varia entre os -10.9°C e os 36.3°C, e o da precipitação entre os 250 mm e os 1933 mm anuais.

Amplia distribución europea, desde el Mediterráneo hasta las zonas templadas de los países nórdicos. Está presente en toda la Península Ibérica con excepción de la franja del litoral mediterráneo. Es mucho más frecuente en la mitad occidental y en el norte, donde selecciona dehesas y espacios abiertos, frecuentando granjas, pueblos y vertederos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -10.9°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 250 mm y 1933 mm al año.

PRESENTE



TSS: 0,3932

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050



2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	-41	-30	-53	54	56	55
2051-2080	-23	-48	-59	55	56	59

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

- Protecção jurídica.
- Medidas para conservação in situ.
- Acções para favorecer a permeabilidade e a conectividade.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.