




© PAULO BARROS

Restrito à Península Ibérica, de onde é endémico e onde habita a parte Central e Sudeste. Geralmente associado a bosques mediterrâneos de azinheiras e sobreiros e áreas de matagal, onde se reproduz em cursos de águas temporários. Na Península, os intervalos de temperatura e precipitação da sua distribuição variam entre os -14,8°C e os 36,2°C, e entre os 362 mm e os 1855 mm por ano, respectivamente.

Endemismo restringido a la Península Ibérica, donde habita su parte suroriental y central. Asociado generalmente a bosques mediterráneos de encinas y alcornoques y zonas de matorral, donde se reproduce en cursos de agua temporales. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14.8°C y 36.2°C, y el de precipitaciones entre 362 mm 1855 mm al año.

PRESENTE



TSS: 0,6280

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050



2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	-10	18	-4	23	26	14
2051-2080	48	17	-20	20	20	14

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

•Não se requerem medidas de adaptação.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

•No se requieren medidas de adaptación.