




© CENEAM-OAPN-MARM / JOSÉ MANUEL REYERO

Espécie endémica da Península Ibérica com distribuição actual em apenas alguns pontos isolados no sul, principalmente na Serra Morena e em Doñana. Frequenta o matagal e o bosque mediterrânico e estende-se desde o nível do mar até aos 1300 m de altitude. O intervalo de temperatura da sua distribuição na Península varia entre os -6.2°C e os 36.1°C, e o da precipitação entre os 370 mm e os 1113 mm anuais.

Especie endémica de la Península Ibérica que se distribuye hoy únicamente en puntos aislados del sur, principalmente Sierra Morena y Doñana. Frecuenta matorral y bosque mediterráneo y su rango altitudinal abarca desde el nivel del mar hasta los 1300 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6.2°C y 36.1°C, y el de precipitaciones entre 370 mm y 1113 mm anuales.

\* Se ha considerado tanto la distribución actual como la histórica - de 1980 - para una mejor estimación del área potencial.

**PRESENTE**



TSS: 0,7078

ÁREA POTENCIAL

**SEDG**

2020-2050



2051-2080



**BAMBU**



**GRAS**



**ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL**

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	21	27	20	6	11	1
2051-2080	90	-27	-1	7	6	1

**MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO**

•Não se requerem medidas de adaptação.

**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN**

•No se requieren medidas de adaptación.