




© MARIO G. PARIS

Restrita à Península Ibérica, de onde é endémica. Encontra-se presente no sul da Península e na parte oriental da sub-meseta norte. Prefere os meios abertos e utiliza os pequenos pântanos e as águas paradas, mais ou menos permanentes, para se reproduzir. Há citações da sua presença na Serra Nevada desde o nível do mar até acima dos 2000 m. Na Península, os intervalos de temperatura e precipitação da sua distribuição variam entre os -4,8°C e os 36,3°C, e entre os 284 mm e os 1230 mm por ano, respectivamente.

Restringido a la Península Ibérica, de donde es endémico. Está presente en el sur peninsular y en la parte oriental de la submeseta norte. Prefiere medios abiertos y utiliza pequeños humedales y encharcamientos más o menos permanentes para reproducirse. Existen citas desde el nivel del mar hasta más de 2000 m, en Sierra Nevada. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4.8°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 284 mm 1230 mm al año.

**PRESENTE**



TSS: 0,4472

ÁREA POTENCIAL

**SEDG**

**2020-2050**

**2051-2080**



**BAMBU**



**GRAS**



**ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL**

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	5	23	10	12	12	10
2051-2080	54	17	13	10	11	9

**MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO**

•Não se requerem medidas de adaptação.

**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN**

•No se requieren medidas de adaptación.