




© MARIO G. PARÍS

Endêmico e presente apenas no sul da Península Ibérica, onde tem preferência por áreas abertas. Utiliza de modo igual águas permanentes e temporárias, geralmente de pequeno tamanho. A sua distribuição vai desde do nível do mar até altitudes próximas dos 2000 m. Na Península, os intervalos de temperatura e precipitação da sua distribuição variam entre os -2.7°C e os 36.3°C e entre os 298 mm e os 1167 mm por ano, respectivamente.

Endemismo sólo presente en el sur de la Península Ibérica, donde prefiere áreas abiertas. Utiliza tanto aguas permanentes como temporales, generalmente de pequeña entidad. Se distribuye desde el nivel del mar hasta altitudes cercanas a los 2000 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -2.7°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 298 mm 1167 mm al año.

**PRESENTE**



TSS: 0,7151

ÁREA POTENCIAL

**SEDG**

**2020-2050**



**2051-2080**



**BAMBU**



**GRAS**



**ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL**

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	8	26	46	24	22	18
2051-2080	69	85	65	17	15	16

**MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO**

•Não se requerem medidas de adaptação.

**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN**

•No se requieren medidas de adaptación.