



© FERNANDO ROMÃO

É endémica da Península Ibérica. Está presente no Sistema Central Ibérico e no seu prolongamento ocidental, assim como na Galiza, e de maneira descontínua na Cordilheira Cantábrica. Pode ser encontrada em ribeiros com sombra, a partir do nível do mar até aos 2425 m de altitude. Na Península, os intervalos de temperatura e precipitação da sua distribuição variam entre os -6,9°C e os 34,6°C, e entre os 510 mm e os 1880 mm por ano, respectivamente.

Endémica de la Península Ibérica. Está presente en el Sistema Central Ibérico y su prolongación occidental, así como en Galicia y, de manera discontinua, la cordillera cantábrica. Habita arroyos en umbrías, desde el nivel del mar hasta los 2425 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6.9°C y 34.6°C, y el de de precipitaciones entre 510 mm 1880 mm al año.



TSS: 0,7475

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050



2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	-20	-11	-30	42	41	41
2051-2080	-13	-24	-38	41	44	40

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

•Não se requerem medidas de adaptação.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

•No se requieren medidas de adaptación.