




© JOÃO L. TEIXEIRA/ARQUIVO FOTOGRÁFICO DO PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA-PORTUGAL

Distribuído por todo o Sudoeste da Europa, ocupa a metade setentrional da Península Ibérica e a área Levantina. Encontra-se presente em meios muito diversos, desde os bosques mediterrâneos e montanhas até aos meios agrários extensivos. Requer pontos de água permanentes, utilizando muitas vezes fontes e perímetros de rega. Pode viver desde o nível do mar até aos 2400 m de altitude nos Pirinéus. Na Península, os intervalos de temperatura e precipitação da sua distribuição variam entre os -10.9°C e os 34.4°C, e entre os 268 mm e os 1873 mm por ano, respectivamente.

Distribuido por todo el sudoeste de Europa, ocupa la mitad septentrional ibérica y el área levantina. Presente en medios muy diversos, desde bosques mediterráneos y montañas, hasta medios agrarios extensivos. Requiere de puntos de agua permanentes, por lo que suele utilizar fuentes y balsas de riego. Llega a vivir desde el nivel del mar hasta los 2400 m de altitud en los Pirineos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -10.9°C y 34.4°C, y el de precipitaciones entre 268 mm 1873 mm al año.

PRESENTE



TSS: 0,5421

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050



2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	-54	-36	-78	62	61	65
2051-2080	-72	-67	-88	61	62	63

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

- Protecção jurídica.
- Medidas para conservação in situ.
- Acções para favorecer a permeabilidade e a conectividade.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.