



© FERNANDO ROMÃO

Encontra-se distribuído por todo o sudoeste da Europa. Na Península Ibérica ocupa grande parte da metade oriental e sudoeste, embora de maneira descontínua. Para reproduzir-se ocupa uma grande variedade de habitats aquáticos, sazonais e permanentes. Pode ser encontrado a partir do nível do mar até 1300 m de altitude, tendo sido encontrado até 1630 m. Na Península, os intervalos de temperatura e precipitação da sua distribuição variam entre -9.7°C e 35.2°C, e entre os 272 mm e os 1230 mm por ano, respectivamente.

Se distribuye por el sudoeste de Europa. En la Península Ibérica ocupa gran parte de la mitad oriental y suroccidental, aunque de manera discontinua. Para reproducirse ocupa gran variedad de ambientes acuáticos, estacionales y permanentes. Puede encontrarse desde el nivel del mar hasta los 1300 m de altitud, habiendo sido citado hasta los 1630 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9.7°C y 35.2°C, y el de precipitaciones entre 272 mm 1230 mm al año.

**PRESENTE**



TSS: 0,5477

ÁREA POTENCIAL

**SEDG**

**2020-2050**



**2051-2080**



**BAMBU**



**GRAS**



**ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL**

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
<b>2020-2050</b>	-55	-48	-99	25	29	18
<b>2051-2080</b>	-98	-88	-100	37	34	0

**MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO**

- Protecção jurídica.
- Medidas para conservação in situ.
- Medidas para conservação ex situ.
- Acções para favorecer a permeabilidade e a conectividade.

**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN**

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.