




© FERNANDO ROMÃO

Encontra-se amplamente distribuída na Europa, ocupando na Península Ibérica a região eurosiberiana de forma contínua. Está presente num grande gradiente de altitude, que vai desde o nível do mar até aos 2700 m nos Pirinéus. Apresenta-se em florestas e matos com abundantes ribeiros assim como em prados húmidos. Utiliza as zonas húmidas naturais e artificiais para se reproduzir, incluindo lagoas, remansos de ribeiros, canais ou valas. Na Península, os intervalos de temperatura e precipitação da sua distribuição variam entre os -10,9°C e os 32,5°C, e entre os 351 mm e os 1878 mm por ano, respectivamente.

Ampliamente distribuida por Europa, en la Península Ibérica ocupa la región eurosiberiana de manera continua. Está presente en un amplio gradiente altitudinal, que abarca desde el nivel del mar hasta los 2700 m en los Pirineos. Habita medios forestales o de matorral con abundantes arroyos, así como pastizales húmedos. Utiliza tanto humedales naturales como artificiales para reproducirse, incluyendo lagunas, remansos de arroyos, canales o abrevaderos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -10.9°C y 32.5°C, y el de precipitaciones entre 351 mm 1878 mm al año.

**PRESENTE**



TSS: 0,8233

ÁREA POTENCIAL

**SEDG**

**2020-2050**



**2051-2080**



**BAMBU**



**GRAS**



**ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL**

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
<b>2020-2050</b>	-70	-27	-95	58	49	89
<b>2051-2080</b>	-89	-74	-95	82	62	83

**MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO**

- Protecção jurídica.
- Medidas para conservação in situ.
- Medidas para conservação ex situ.
- Acções para favorecer a permeabilidade e a conectividade.

**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN**

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.