



© DIEGO LLUSIA

Encontra-se amplamente distribuído pela Europa Central, alcançando o norte da Península Ibérica, apesar de estar ausente nos Pirinéus. Também aparece pontualmente no Sistema Central Ibérico, onde foi introduzido. Está presente desde o nível do mar até aos 2200m de altitude. Frequenta massas florestais e pastagens, utilizando uma vasta gama de áreas húmidas naturais ou de origem antrópica. Na Península, os intervalos de temperatura e precipitação da sua distribuição variam entre os 5°C e os 27.9°C, e entre os 784 mm e os 1625 mm por ano, respectivamente.

Ampliamente distribuido por centroeuropa, alcanza el norte de la Península Ibérica, aunque falta en el Pirineo. También aparece puntualmente en el Sistema Central Ibérico, donde ha sido introducido. Está presente desde el nivel del mar hasta 2200 m de altitud. Frecuenta masas forestales y pastizales, utilizando una amplia gama de humedales naturales o de origen antrópico. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -5°C y 27.9°C, y el de precipitaciones entre 784 mm 1625 mm al año.

PRESENTE



TSS: 0,8947

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050

2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	-91	-41	-100	48	15	0
2051-2080	-99	-80	-100	0	20	0

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

- Protecção jurídica.
- Medidas para conservação in situ.
- Medidas para conservação ex situ

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ..