




© DIEGO LLUSIA

É considerada endémica da Península Ibérica, onde ocupa - de uma maneira dispersa - praticamente toda a região mediterrânea. De hábitos subterrâneos, está presente em bosques e matagais termófilos, desde o nível do mar até aos 1800 m. O intervalo de temperatura da sua distribuição na Península varia entre -6.8°C e 36.3°C, e a precipitação entre 214 mm e 1526 mm anuais.

Se considera endémica de la Península Ibérica, donde ocupa -de manera dispersa- prácticamente toda la región mediterránea. De hábitos subterráneos, está presente en bosques y matorrales termófilos, desde el nivel del mar hasta los 1800 m. Se presenta a una temperatura mínima de -6.8°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1526 mm anuales.

PRESENTE



TSS: 0,5266

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050



2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	73	55	102	30	33	26
2051-2080	99	94	114	27	27	25

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

•Não se requerem medidas de adaptação.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

•No se requieren medidas de adaptación.