




© CÉSAR CAPINHA

Na Europa existe só na Península Ibérica, sul de França e norte de Itália. Ocupa quase toda a Península, com excepção de grandes áreas nos Pirinéus e na cordilheira Cantábrica. Está presente numa grande diversidade de habitats, mas prefere os meios abertos onde pode encontrar refúgios abundantes (como os prados ou formações arbustivas em mosaico). Está presente desde o nível do mar até altitudes superiores aos 2500 m. O intervalo de temperatura da sua distribuição varia entre os -9.7°C e os 36.3°C, e o da precipitação entre os 214 mm e os 1949 mm anuais.

En Europa, únicamente presente en la Península Ibérica, el sur de Francia y el norte de Italia. Ocupa la práctica totalidad de la Península, con excepción de amplias zonas en los Pirineos y la Cantábrica. Presente en gran diversidad de biotopos, aunque prefiere medios abiertos donde pueda encontrar abundantes refugios (como dehesas o formaciones arbustivas parcheadas), y está presente desde el nivel del mar hasta cotas superiores a 2500 m. Se presenta a una temperatura mínima de -9.7°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

**PRESENTE**



TSS: 0,3090

● ÁREA POTENCIAL

**SEDG**

2020-2050



2051-2080



**BAMBU**



**GRAS**



**ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL**

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	-18	-11	-38	69	70	68
2051-2080	-11	-12	-38	68	68	66

**MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO**

•Não se requerem medidas de adaptação.

**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN**

•No se requieren medidas de adaptación.