



© CENEAM--OAPN-MARM / JOSÉ LUIS DE LA CRUZ ALEMÁN

É endémico da Península Ibérica. Encontra-se distribuído pelo Noroeste da Península e pelo Sistema Central, desde o nível do mar até aos 2100 m de altitude. Aparece pontualmente em outras áreas montanhosas mais a sul. Está associado a áreas com elevada humidade. Frequenta as orlas e as clareiras dos bosques, margens dos ribeiros e áreas de matos. O intervalo de temperatura da sua distribuição varia entre os -6.9°C e os 35.2°C, e o da precipitação entre os 448 mm e os 1949 mm anuais.

Endémico de la Península Ibérica, se distribuye por el noroeste peninsular y por el Sistema Central, desde el nivel del mar hasta 2100 m de altitud. Más puntualmente, aparece en otras zonas montañosas más meridionales. Asociado a áreas con elevada humedad. Frecuenta bordes y claros en bosques, orillas de arroyos y áreas de matorral. Se presenta a una temperatura mínima de -6.9°C y 35.2°C, y el de precipitaciones entre 448 mm y 1949 mm anuales.



TSS: 0,7012

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050



2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	-30	-16	-42	47	43	46
2051-2080	-22	-30	-45	45	48	49

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

•Não se requerem medidas de adaptação.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

•No se requieren medidas de adaptación.