



© EDUARDO MARABUTO

É endémica da Península Ibérica e está presente no seu quadrante Noroeste e no Sistema Central até à Serra da Estrela. Actualmente está separada em várias espécies que anteriormente eram consideradas subespécies. Embora prefira ocupar áreas rochosas e pastagens em altitudes até 2500 m, também se encontra ao nível do mar no litoral da Galiza. O intervalo de temperatura da sua distribuição varia entre os -6.9°C e os 27.4°C, e o da precipitação entre os 753 mm e os 1926 mm anuais.

Endemismo ibérico presente en el cuadrante noroccidental peninsular y en el Sistema Central hasta la Sierra de la Estrela. Actualmente separado en varias especies que anteriormente eran consideradas subespecies. Aunque suele ocupar zonas rocosas y pastizales a altitudes hasta 2500 m, también puede encontrarse al nivel del mar en la costa gallega. Su rango de temperaturas varía entre -6.9°C y 27.4°C, y el de precipitación entre 753 mm y 1926 mm anuales.

PRESENTE



TSS: 0,9063

ÁREA POTENCIAL

SEDG

2020-2050



2051-2080



BAMBU



GRAS



ALTERAÇÃO DE ÁREAS POTENCIAIS NO FUTURO / CAMBIOS FUTUROS EN EL ÁREA POTENCIAL

	Variação de Área / Variación de Área			Área potencial futura ocupada		
	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)	SEDG (%)	BAMBU (%)	GRAS (%)
2020-2050	-89	-61	-98	32	25	0
2051-2080	-95	-90	-99	9	15	0

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

- Protecção jurídica.
- Medidas para conservação in situ.
- Medidas para conservação ex situ.
- Acções para favorecer a permeabilidade e a conectividade.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.